

D витамини – организмдеги минералдык баланс үчүн зарыл болгон эң маанилүү витаминдердин бири, түйүлдүктүн өнүгүүсүнөн тартып жашоонун ар бир этабында маанилүү роль ойнойт. Фосфор-кальций алмашуусун нормалдаштырат, сөөк ткандарын бекемдейт, иммуномодулятор болуп саналат, онкологиялык жана аутоиммундук оорулардын өнүгүү коркунучун азайтат, артериялык гипертониянын ыктымалдыгын төмөндөтөт.

Холекальциферол (D3 витамини) – биоактивдүү зат, прогормон, D1–D6 тобунун ичиндеги эң жеңил сиңүүчү форма. Алмашуу процесстерин стимулдайт, минералдардын сиңишин тездетет. Гормон сыяктуу касиеттерди көрсөтөт – көмүрсуу алмашуусун нормалдаштырат. Көңүлдү көтөрөт, тынчсызданууну, нерв-психикалык бузулууларды, депрессияны азайтат, уйкусуздукту жоёт, жүрөк, кан тамырлар жана кан түзүү органдарынын ишин жакшырат.

Препараттагы D3 витамининин биожеткиликтүүлүгү токоферол (E витамини) менен камсыздалган; холекальциферол – майда эригич зат болуп, липиддер менен айкалышта жакшы сиңет.

D3 витамининин жогорулатылган дозасы өтө сейрек учурларда гана колдонууга көрсөтүлөт жана дарыгердин сунушу менен гана кабыл алынышы керек. D3 организмде топтолгондуктан, жогорку дозаларды узак убакыт колдонуу сөөк ткандарынын патологиялык деминерализациясына, кальций туздарынын топтолушуна алып келиши мүмкүн.

- иммуномодулятор, вирустук оорулардын коркунучун азайтууга көмөктөшөт
- организмдин энергетикалык потенциалын жогорулатат
- жүрөк-кан тамыр жана нерв системасынын саламаттыгын колдойт
- тиштерди жана сөөк ткандарын бекемдөөгө көмөктөшөт
- теринин абалына оң таасир этет

КУРАМЫ

Орто чынжырлуу триглицериддердин майы, холекальциферол, токоферолдор аралашмасынын концентраты (антиоксидант).

КОЛДОНУУ

Чондорго – тамак учурунда 4 тамчы (0,1 мл), тамакка же суусундукка кошуп колдонсо болот. 3 жаштан жогору балдарга – 2 тамчы (0,05 мл). Кабыл алуу узактыгы – 1 ай. Зарыл болгон учурда БАДды кайра кабыл алууга болот. Колдонуудан мурун дарыгер менен кеңешүү сунушталат.

Балдарга, кош бойлуу жана эмизген аялдарга – педиатр дарыгердин сунушу жана көзөмөлү астында кабыл алуу керек.

Дары каражаты эмес.

Каршы көрсөтмөлөр: БАД компоненттерине жеке чыдамсыздык.

Жарактуулук мөөнөтү:

2 жыл