

Дарынын формасы: капсулалар 3,5 мг.

Курамы: 1 капсулада лиофилизацияланган бактерия лизаты 3,5 мг; жардамчы заттар — натрий глутаматы, магний стеараты, маннитол, жүгөрү крахмалы.

Сыпаттамасы: көк капкагы бар ак түстөгү тунук эмес желатин капсулалар. Ичкиси ашказандын кычкыл чөйрөсүнө туруктуу, жоон ичекте сиңет. Антигенди APC-клеткалар кармап, дем алуу жолдорунун былжыр челдеринде секретордук IgA түзүлүшүн стимулдайт, бул бактериялык жана вирустук инфекциялардан коргонуу деңгээлин жогорулатат.

Фармакодинамика

Препарат курамында дем алуу жолдорунун инфекцияларын көпчүлүк учурда пайда кылуучу бактериялардын лизаттары бар: *Diplococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella ozaenae*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *Neisseria catarrhalis*.

Бронхо-Мунал иммундук жоопту модуляциялайт:

- альвеолярдык макрофагдарды жана сезгенүүгө каршы цитокиндердин продукциясын активдештирет;
- айланма Т-лимфоциттердин санын көбөйтөт;
- перифериялык моноциттерди стимулдайт;
- секретордук IgA деңгээлин жогорулатат;
- коргоочу адгезивдик молекулалардын өндүрүшүн күчөтөт;
- гиперсезимталдык фактору болгон IgE деңгээлин төмөндөтөт;
- дем алуу жолдорунун инфекцияларынын жыштыгын, узактыгын жана оордугун азайтат, антибиотикке муктаждыкты төмөндөтөт.

Колдонууга көрсөтмөлөр

Дем алуу жолдорунун ооруларын комплекстүү дарылоо.

Жогорку жана төмөнкү дем алуу жолдорунун рецидивирлөөчү инфекцияларынын алдын алуу: өнөкөт бронхит, тонзиллит, фарингит, ларингит, ринит, синусит, отиттер.

Колдонуу ыкмасы жана дозасы

Чоңдор жана 12 жаштан улуу балдар

Профилактика:

1 капсула күнүгө 1 жолу — 10 күн; курстар 20 күндүк тыныгуу менен 3 ай катарынан кайталанат.

Инфекциянын курч фазасы:

1 капсула күнүгө 10–30 күн; андан соң кийинки эки айда ар айдын 10 күнү 1 капсула (курстар ортосу — 20 күн).

Антибиотик дайындалса, препарат параллелдүү колдонулат.

6 айдан 12 жашка чейинки балдар (Бронхо-Мунал П)

Профилактика:

1 капсула күнүгө 10 күн, 3 ай катары менен, курстар ортосунда 20 күн тыныгуу.

Курч фаза:

1 капсула күнүгө 10–30 күн; андан кийин кийинки эки айдын ар биринде 10 күндөн 1 капсула.

Антибиотикотерапия талап кылынса, антибиотик менен бирге колдонулат.

Жутууга кыйын болгон балдар үчүн: капсуланын ичин чай, сүт же шире менен аралаштырып берүү. Кабыл алуу: эртең менен, ач карын.

Терс таасирлери

Сейрек кездешет, адатта жеңил жана кыска мөөнөттүү:

- ашказан-ичеги бузулуулар (карын ооруу, жүрөк айлануу, кусуу, диарея);
- температуранын жогорулашы;
- сейрек гипер сезгич реакциялары.

Каршы көрсөтмөлөр

- препараттын компоненттерине гиперсезимталдык;
- 6 айга чейинки жаш курак.

Дары-дармектер менен өз ара аракеттениши

Аныкталган эмес.

Өзгөчө көрсөтмөлөр

Тирүү вакциналарды жана Бронхо-Муналды колдонуу ортосунда жок дегенде 4 жума аралык сактоо.

Кош бойлуулук жана эмизүү мезгили: коопсуздугу тууралуу жетиштүү маалымат жок.

I триместр — сунушталбайт.

II–III триместр — «пайда/кооптуулук» катышын баалагандан кийин гана.

Эмизүү учурунда кабыл алганда — эмизүүнү токтотуу сунушталат.

Транспорт жана механизмдерди башкарууга таасир этпейт.

Дозадан ашып кетүү

Катталган эмес.

Чыгарылуу формасы

Бронхо-Мунал П: капсулалар 3,5 мг, 10 даана - блистерде; 1 блистер - картон таңгакта.

Сактоо шарттары

Температура +25 °C төмөн сактоо.

Балдар жетпеген жерге сактоо.

Жарактуулук мөөнөтү: 5 жыл.

Кутуда көрсөтүлгөн мөөнөт өткөндөн кийин колдонбоңуз.