

Чыгаруу формасы: пленка менен капталган таблеткалар.

Таасир этүүчү заты: розувастатин кальцийи.

Максаты:

Препарат кандагы холестериндин жана триглицериддердин деңгээлин төмөндөтөт, атеросклероздун өнүгүшүн жайлатат жана жүрөк-кан тамыр ооруларынын (инфаркт, инсульт) коркунучун азайтат.

Көрсөтмөлөрү:

Гиперхолестеринемияда, аралаш дислипидемияда, гипертриглицеридемияда, үй-бүлөлүк гиперхолестеринемияда, ошондой эле жүрөк-кан тамыр ооруларынын коркунучу жогору болгон бейтаптарда алдын алуу максатында колдонулат.

Колдонуу ыкмасы:

Ичке күнүнө 1 жолу, тамакка көз каранды эмес кабыл алынат.

Таблетканы чайнабай, толугу менен суу менен жутуу керек.

Дарылоого чейин жана дарылоо учурунда гипохолестериндик диетаны сөзсүз сактоо зарыл.

Баштапкы доза адатта 5–10 мг, дарыгер тарабынан жеке тандалат.

Дозаны өзгөртүү 4 жумадан эрте эмес жүргүзүлөт.

Каршы көрсөтмөлөр:

Кош бойлуулук жана эмчек эмизүү мезгили, боор оорулары активдүү фазада, оор даражадагы бөйрөк жетишсиздиги, миопатия, циклоспоринди бир убакта кабыл алуу, 18 жашка чейинки курак, лактозаны көтөрө албоо.

Сактык чаралары:

Улгайган бейтаптарда, бөйрөк ооруларында, гипотиреоздо жана булчуң татаалдашууларынын коркунучу бар учурда этияттык менен колдонулат.

Булчуңдар ооруп же алсыздык пайда болсо, дарыгерге кайрылуу зарыл.

Терс таасирлери (мүмкүн болгон):

Баш оору, баш айлануу, булчуңдардын оорушу, жүрөк айлануу, ич катуу, боор ферменттеринин жогорулашы; сейрек учурларда — оор булчуң татаалдашуулары.

Сактоо шарттары:

25 °Cден жогору эмес температурада, баштапкы таңгакта, балдардын колу жетпеген жерде сактоо.