

Состав

Одна таблетка Фамосана, покрытая оболочкой, содержит 20мг или 40 мг фамотидина.

Описание

Для 20 мг: таблетки чечевицеобразной формы, коричнево-розового цвета, с гладкой поверхностью.

Для 40 мг: таблетки чечевицеобразной формы, коричнево-желтого цвета, с гладкой поверхностью.

Фармакотерапевтическая группа:

Блокаторгистаминовых H₂-рецепторов

[A02BA03]

Фармакологические свойства

Вызывает дозозависимое подавление продукции соляной кислоты и уменьшение активности пепсина, что создает оптимальные условия для рубцевания язвы. Подавляет базальную и стимулированную секрецию соляной кислоты в желудке более, чем на 80-90% - через 2 часа, через 6 часов - на 70-75%, через 10 часов - на 40-45 %. Существенно не изменяет уровень гастрина в плазме. Фамотидин оказывает цитопротективное действие: повышается синтез простагландинов в слизистой оболочке желудка, увеличивается продукция слизи, улучшается кровоток. Продолжительность действия препарата при однократном приеме зависит от дозы и составляет от 12 до 14 часов.

Показания к применению

Язвенная болезнь 12-перстной кишки и желудка в фазе обострения, профилактика рецидивов.

Симптоматические (стресс-язвы, ятрогенные и др.) язвы.

Хронический панкреатит в фазе обострения.

Функциональная диспепсия, ассоциированная с повышенной секреторной функцией желудка.

Эрозивный эзофагит, рефлюкс-эзофагит.

Профилактика кровотечений из верхних отделов желудочно-кишечного тракта при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, геморрагическом гастрите.

Синдром Золлингера-Эллисона.

Способ применения и дозы

При язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки обычно назначают по 20 мг 2 раза в сутки или по 40 мг 1 раз в сутки на ночь. При необходимости суточная доза может быть увеличена до 80-160мг. С целью профилактики рецидивов назначают по 20 мг 1 раз в сутки перед сном. Таблетки Фамосана следует проглатывать не раскусывая, запивая достаточным количеством воды. При синдроме Золлингера-Эллисона способ дозирования определяется тяжестью заболевания. В большинстве случаев по 20-40 мг каждые 6 часов до клинического улучшения. Максимальная суточная доза препарата не должна превышать 480 мг фамотидина. Лечение продолжают столь длительное время, на сколько это необходимо.

Побочное действие

Со стороны ЖКТ и печени: сухость во рту, тошнота, рвота, метеоризм, запор, диарея, нарушение аппетита; повышение активности печеночных ферментов.

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, усталость, сонливость.

Со стороны лабораторных показателей: увеличение уровня мочевины, лейкопения, тромбоцитопения.

Прочие: очень редко – кожная сыпь, нарушение менструального цикла.

Противопоказания

Беременность, лактация, повышенная чувствительность к фамотидину и другим блокаторам H_2 - гистаминовых рецепторов.

Дети до 6 лет.

Особые указания

Перед началом терапии блокаторами H_2 -гистаминовых рецепторов необходимо провести гистологическое исследование для того, чтобы исключить злокачественный характер болезни. При хронической почечной недостаточности требуется коррекция дозы препарата. Также следует с осторожностью назначать препарат пациентам с нарушениями функции печени.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном применении с антацидными средствами, содержащих магний и алюминий, происходит снижение интенсивности абсорбции Фамосана, поэтому перерыв между приемом этих препаратов должен составлять не менее 1-2 часов.

Форма выпуска

Таблетки по 20 мг: 20 таблеток в упаковке.

Таблетки по 40 мг: 10 таблеток в упаковке.

Условия хранения

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре 15 – 25°C.

Срок годности

4 года. Нельзя применять препарат позже срока, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Отпускается по рецепт у врача.