

**Форма выпуска:** таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

**Действующее вещество:** розувастатин кальция.

**Назначение:**

Препарат снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови, замедляет развитие атеросклероза и снижает риск сердечно-сосудистых осложнений (инфаркт, инсульт).

**Показания:**

Применяется при гиперхолестеринемии, смешанной дислипидемии, гипертриглицеридемии, семейной гиперхолестеринемии, а также для профилактики сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с повышенным риском.

**Способ применения:**

Принимать внутрь 1 раз в сутки, независимо от приема пищи.

Таблетку глотать целиком, запивая водой.

Обязательно соблюдать гипохолестериновую диету до и во время лечения.

Начальная доза обычно 5–10 мг, подбирается врачом индивидуально.

Коррекция дозы возможна не ранее чем через 4 недели.

**Противопоказания**

Беременность и грудное вскармливание, заболевания печени в активной фазе, тяжелая почечная недостаточность, миопатия, одновременный прием циклоспорина, возраст до 18 лет, непереносимость лактозы.

**Меры предосторожности:**

С осторожностью применять у пожилых пациентов, при заболеваниях почек, гипотиреозе, риске мышечных осложнений. При появлении мышечных болей или слабости необходимо обратиться к врачу.

**Побочные действия (возможные):**

Головная боль, головокружение, боли в мышцах, тошнота, запор, повышение печеночных ферментов; редко — тяжелые мышечные осложнения.

**Хранение:**

Хранить при температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте.