

Курамы жана сүрөттөлүшү

Активдүү зат:

1 флакон (20 мл) тамчылар төмөнкүлөрдү камтыйт: бутамират цитраты (100 % затка кайра эсептөөдө) – 100,0 мг.

Жардамчы заттар:

Сорбитол (Neosorb 70/70 В, сорбитол сиропу) – 8100,0 мг, глицерол (глицерин) – 5800,0 мг, этанол 95 % (этил спирти 95 %) – 61,0 мг, натрий сахаринаты – 23,0 мг, бензой кычкылы – 23,0 мг, ванилин – 23,0 мг, натрий гидроксиди 30 % эритмеси – 10,0 мг, тазаланган суу – 20 млге чейин.

Сүрөттөлүшү:

Коделак® Нео – чоңдор жана балдар үчүн кургак жөтөлгө каршы күчтүү каражат.

- Кургак жөтөлдүн кармашын басат, анын ичинде түнкү убакта;
- Жөтөлгө каршы таасир берет, бронхдорду бир аз кеңейтет, дем алуу жеңилдейт;
- Узартылган таасирге ээ: суюк формалар үчүн (сироп жана тамчылар) 6–8 саатка чейин*, таблетка түрүндө – 12 саатка чейин**;
- Дем алуу системасын баспайт, көнүмүштү жаратпайт;
- 2 айлык жаштан баштап балдарга колдонууга уруксат берилген (тамчы түрүндө);
- Кант диабети менен ооругандар колдоно алышат – курамында сахароза жана глюкоза жок.

Ар кандай жаш курактагы топтор үчүн 3 формада чыгарылат:

- 2 айдан баштап балдар үчүн тамчылар;
- 3 жаштан баштап балдар жана чоңдор үчүн сироп;
- 18 жаштан улуулар үчүн таблеткалар.

Суюктук – тунук, түссүз же бир аз сары түстө, ванилдин жыты бар. Жеңил булуттуулукка жол берилет. Ар бир флакондо биринчи ачылышты көзөмөлдөгөн пластик капкак бар. Так дозалоо флакон-капельницанын жардамы менен жүргүзүлөт. 1 мл = 22 тамчы, жалпысынан 440 доза-капка эсептелген.

Чыгаруу формасы:

Ичке колдонулуучу тамчылар 5 мг/мл. 20 мл флакон-капельница, кара түстөгү айнек идиште. Флакон колдонуу көрсөтмөсү менен картон кутуга салынган.

Каршы көрсөтмөлөр:

Препараттын курамындагы компоненттерге жогорку сезимталдык, фруктозаны көтөрө албастык, кош бойлуулуктун I триместри, эмизүү мезгили. 2 айга чейинки балдарга колдонууга болбойт.

Этияттык менен:

Кош бойлуулук (II жана III триместри). Препаратта этил спирти болгондуктан, дарыга көз карандылыкка жакын бейтаптарга, боор оорусу, алкоголизм, эпилепсия, мээ оорулары менен жабыркагандарга, кош бойлууларга жана балдарга этияттык менен колдонуу сунушталат.

Дозасы:

5 мг/мл.

Колдонууга көрсөткүчтөр:

Кургак жөтөлдүн бардык түрлөрү, анын ичинде көк жөтөлдө; операциянын алдында жана кийин, бронхоскопия учурунда жөтөлдү басуу үчүн.

Башка дары каражаттар менен өз ара аракеттешүүсү:

Бутамират үчүн белгилүү болгон дары өз ара аракеттенүүлөрү жок. Дарыны колдонуу маалында алкоголь ичимдиктерин жана борбордук нерв системасын басуучу каражаттарды (уйку дарысы, транквилизаторлор, нейролептиктиктер ж.б.) ичүү сунушталбайт.

Бутамират жетөл рефлексин баскандыктан, мокроткону көбөйтчү дары каражаттар менен бирге колдонууга болбойт – бул бронхоспазмга же дем алуу жолдорунун инфекциясына алып келиши мүмкүн.

Кош дозадан ашып кетүү:

Белгилери: жүрөк айлануу, кусуу, уйку басуу, ич өткөк, баш айлануу, кан басымдын төмөндөшү, кыймылдардын координациясынын бузулушу.

Дарылоо: активдештирилген көмүр, туздуу ич жүргүзгүчтөр, симптоматикалык терапия.

Фармакологиялык таасири

Фармакологиялык тобу: борбордук таасирдеги жетөлгө каршы каражат.

Фармакодинамикасы:

Бутамират – Коделак® Нео дарысынын активдүү заты, борбордук таасирдеги жетөлгө каршы каражат. Апиийм алкалоиддерине химиялык да, фармакологиялык да тиешеси жок. Көнүмүштү жаратпайт.

Жетөл борборуна түз таасир берип, жетөлдү басат. Бронходилатация (bronхолорду кеңейтүү) таасирин берет. Дем алууну жеңилдетип, спирометриялык көрсөткүчтөрдү жакшыртат (дем алуу жолдорунун каршылыгын төмөндөтөт), канды кычкылтек менен каныктырат.

Фармакокинетикасы:**Синүү:**

Ичке кабыл алгандан кийин бутамират тез жана толук сиңет. 150 мг дозадан кийин негизги метаболит (2-фенилмай кислотасы) канда 1,5 сааттан кийин 6,4 мкг/мл концентрацияга жетет.

Таралышы жана метаболизм:

Бутамираттын гидролизи канда башталат. Метаболиттери да жетөлгө каршы активдүүлүккө ээ жана 95 %дан ашуун плазма белоктору менен байланышат. Кумуляция болбойт.

Чыгуу:

Жарым ажыроо мөөнөтү – 6 саат. Негизинен бөйрөк аркылуу чыгарылат.

Кош бойлуулук жана эмизүү мезгили:

Кош бойлуу аялдарда препараттын коопсуздугу жана плацентардык тосмодон өтүүсү тууралуу маалыматтар жок. I триместрде колдонууга болбойт. II жана III триместрде дарыны колдонуу пайда/зияны эске алынып жүргүзүлөт. Эмизүү маалында колдонууга сунушталбайт.

Кыйыр таасирлер:

Нерв системасынан: сейрек – уйку басуу, баш айлануу.

Ичеги-карын жолунан: сейрек – жүрөк айлануу, ич өткөк.

Териден: сейрек – аллергия, кызылча.

Өзгөчө көрсөтмөлөр:

Тамчыларда натрий сахаринаты жана сорбитол бар – кант диабети менен ооругандарга жарайт.

Курамында этил спирти болгондуктан, көз карандылыкка жакын адамдарга этияттык менен колдонулат.

Унаа башкарууда жана механизмдер менен иштөөгө таасири:

Баш айлануу жана уйку басуу болушу мүмкүн, ошондуктан унаа айдоодон жана кооптуу иштерден алыс болуу керек.

Сактоо шарттары:

25°C жогору эмес температурада, балдардын колу жетпеген жерде сактоо керек.

Колдонуу жолу жана дозасы

Ичке, тамактанардын алдында кабыл алынат. Ичке колдонулуучу тамчылар – 5 мг/мл (1 мл = 22 тамчы).

- 2 айдан 12 айга чейинки балдарга — күнүнө 4 жолу 10 тамчыдан;
 - 1 жаштан 3 жашка чейинки балдарга — күнүнө 4 жолу 15 тамчыдан;
 - 3 жаштан жогорку балдарга — күнүнө 4 жолу 25 тамчыдан.
- 2 жашка чейинки балдарга дарыны берүүдөн мурун дарыгер менен кеңешүү керек.

Эгер дарыны колдонгондон кийин 5 күндөн ашык убакыт бою жөтөл сакталса, дарыгерге кайрылуу зарыл.

Маалымат

Продуктун сырткы көрүнүшү сүрөттө көрсөтүлгөндөн айырмаланышы мүмкүн. Каршы көрсөтмөлөрү бар. Колдонуу көрсөтмөсү менен таанышуу же адиске кайрылуу сунушталат.