

Түзүмү

Бир таблеткада төмөнкү активдүү заттар бар:

Ацетилсалицил кислотасы – 324 мг

Суу жок лимон кислотасы – 965 мг

Натрий гидрокарбонаты – 1743,87 мг (сухой натрий гидрокарбонатына эквиваленттүү — 1625 мг)

Кошумча заттар:

Повидон 25, кальций силикаты жана/же диметикон, натрия докзаты, натрия бензоаты, натрия сахаринаты, лимон даамы, лайм даамы

Сүрөттөлүшү

Ак түстөгү тегерек, жалпак газдалма таблеткалар. Бир жакта «ALKA SELTZER» таңакталып, экинчи жагында фаска бар.

Фармакотерапевтик топ

Анальгетиктер, антипиретиктер; салицил кислотасы жана анын туундулары. АТС коду: N02BA51.

Фармакологиялык касиеттери

Курдуку препарат — анын ичинде бар компоненттердин бири таасирин тийгизет.

*Ацетилсалицил кислотасы ооруну басат, температураны төмөндөтөт жана сезгенүүгө каршы иштейт, простагландиндердин синтези үчүн жооптуу циклооксигеназа энзимдерин бууп, тромбосан А2дин синтезине тоскоол болот.

*Натрий карбонаты ичегидеги ашказандын кислотасын нейтралдап, препараттын тынчсыздандыруучу таасирин азайтат.

*Лимон кислотасы дарынын сиңип кетишин тездетет.

Колдонулуу көрсөткүчтөр

*Баш оору (оорукана, мас абалдан кийин)

*Тиш оору

*Тамак ооруйт

*Арка жана булчуң оорулары

*Баштыкчалардагы оору (сүйкөм), менструациядагы оорулар

*Жогорку температура (ОРВИ, грипп жана башка инфекциялык-сезгенүүлө жаракаттарда) — чоңдорго жана 15 жаштан жогору балдарга

Колдонуу ыкмасы жана дозасы

Суусундукта эрип ичилет.

*Бир жолу: 1 таблеткадан 6 жолу чейин күнүнө.

*Катуу оору же жогорку температурада: 2-3 таблетка; максималдуу дозасы — 9 таблетка (3 г).

*Таблетканы 200 мл сууга эрип, ичүүдөн мурун колдонулат.

*Препарат кабыл алуу аралыгы 4 сааттан кем болбошу керек.

*Доктур менен кеңешсиз ооруну басуу үчүн — 5 күн, температураны түшүрүү үчүн — 3 күндөн ашырбоо шарт.

Кыйыр таасирлери

*Ашказандагы оору, жүрөк кагышы (изжога), кусуу, жүрөк айнуу

*Кан агуу тобу (асказан же мурун аркылуу)

*Аны сейрек учурларда — боор функциясынын бузулуусу (трансаминазалардын жогорулоосу)

*Тери тайгалдоосу, бронхоспазм, Квинк уламышы (шишик), анафилактикалык реакциялар

Каршылык

- *Компоненттерге жекече сезгичтик
- *Салицилатка же башка НПВС-ке реакция, астма
- *Ашказан–ичек трактынын оюктары (активдүү фазада)
- *Кан агуу абалы (геморрагиялык диатез)
- *Метотрексат (15 мг/жумадан көп) менен кош колдонуудан кароо
- *Жаттык: I и III триместрлеринин ичинде; лактация
- *16 жашка чейинки балдарда вирустук ОРВИ учурунда — Рейе синдромуна байланыштуу

Дарылар менен өз ара аракеттешүү

- *Метотрексат (≥ 15 мг/жума) — гемолитикалык токсичность жогорулайт; тромбокластикалык заттар, антикоагулянттар менен бирге — кан агуу тобу көбөйөт;
- *НПВСлар же 3г/күндөн жогорку салицилат дозалары менен — язва жана кан агуу тобу коркунучу жогорулайт;
- *Бензбромарон сыяктуу урикозураттар менен — урикозурикалык таасир төмөндөйт; дигоксин менен — сактоо жүктөмү жогорулайт;
- *Инсулин жана башка диабеттик дары-дармектер менен — гипогликемия коркунучу; тромболитиктер менен — кан агуу тобу;
- *Диретиктер (≥ 3 мг/күн) же АПФ ингибиторлору (≥ 3 г/күн) — гломерулярдык фильтрация төмөндөшү; ГКС (гидрокортизондан башка) менен — салицилаттын айланышын тездетет; вальпроев кислотасы менен – токсичность жогорулайт; этанол менен — ички органдардын шыкактык зыян жана кан агуу убактысы көбөйөт.

Өзгөчө көрсөтмөлөр (Особые указания)

- *Астма, бронхолектик оорулар, нос полиптери, аллергиялык риниттер учурда бронхоспазм болушу мүмкүн.
- *Тишке же башка хирургиялык аракети жүргүзүүдөн мурун, кан токтотуу үчүн препаратты 5–7 күн мурда токтотуу сунушталат.
- *Кардарылык ооруларда: салицилаттын көнүлүн эсепке алуу (75-300 мг/күн).
- *Антикоагулянттар, подагра, жаралык оорулар, бөйрөк/боор жетишсиздигинде сактык керек.
- *Бир таблеткада 477 мг натрий бар, натрийге көзөмөлдүү диетада эске алуу керек.
- *Котормо механизмдер же унаа башкарууга таасир этпейт.

Ашыкча доза кабыл алуу

- *Орточа деңгээлде: жүрөк айнуу, кусуу, кулакка шыпоо, угуу кыйынчылыгы, баш оору, баш айлануу, аң-сезимдин татаалдашы — дозаны төмөндөтүү менен өтөт.
- *Оор абалда: ысытма, гипервентиляция, кетоз, респиратордук алкалоз, метаболикалык ацидоз, кома, жүрөк шоки, дем алуу жетишсиздиги, гипогликемия.
- *Дарылоо: лаваж, активдештирилген көмүр, кислоталык-сабындык баланс контролу, щелочтуу диурез (мөңгүлөрдө рН 7.5-8), гемодиализ, суюктукту калыбына келтирүү, симптоматикалык дарылоо.

Башка маалыматтар

- Мурдагы жеткирүү формасы: 2 таблетка токтоо таңгак (стрит), картон кутусунда — 5 пакет же 10 таблеткалык пачкалар.
- Сактоо шарттары: 25 °С чейин, балдардын жетимсиз жеринде.
- Сакталыш мөөнөтү: 3 жыл; мөөнөтү өткөндөн кийин колдонбоо.
- Рецептсиз (аптекалардан сатып алса болот).