

Состав

Одна таблетка содержит активные вещества:

лидокаина гидрохлорид - 1.0 мг,

хлоргексидина диглюконат - 1.0 мг,

иротрицин - 0.5 мг,

вспомогательные вещества:

сорбитол, магния стеарат, масло мятное.

Описание

Таблетки белого цвета, круглой формы, с плоской поверхностью, скошенным краем, диаметром (13.0 ± 0.2) мм и высотой (4.0 ± 0.2) мм.

Показания к применению

-воспалительные и инфекционные заболевания полости рта и глотки (стоматит, гингивит, пародонтит, глоссит, тонзиллит, фарингит и другие состояния, сопровождающиеся затрудненным глотанием)

-профилактика инфекции перед и после оперативного вмешательства в полости рта и глотки (экстракция зубов, хирургическое лечение десен, тонзиллэктомия).

Способ применения и дозы

Трахисан - таблетки для рассасывания - принимать по одной таблетке каждые 2 часа. Суточная доза для взрослых и детей старше 12 лет - 8 таблеток, для детей от 6 до 12 лет - 6 таблеток. Симптомы болезни исчезают через несколько дней, однако для достижения стойкого терапевтического эффекта рекомендуют продолжить терапию еще на 2 - 3 дня. Если через 5 дней применения препарата, улучшения состояния не последовало, следует изменить тактику лечения.

Побочные действия

-кратковременные изменения вкуса, онемение языка, проходящие через короткое время

-незначительное окрашивание в желтый или светло-коричневый цвет зубов, зубных пломб и протезов или языка, которое можно устранить с помощью гигиены полости рта. Окрашивание исчезает самопроизвольно после прекращения приема препарата.

Противопоказания

-повышенная чувствительность к какому-либо ингредиенту препарата

-повреждения слизистой оболочки ротовой полости (эрозия)

-открытые раны в ротовой и фарингеальной полости-детский возраст до 6 лет

Лекарственные взаимодействия

До настоящего времени неизвестны

Особые указания

Препарат можно применять пациентам, страдающим сахарным диабетом.

Беременность и период лактации

Применение препарата в период беременности и лактации возможно в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Не влияет

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

3 года. Не применять по истечению срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта