

Кломет №7 вагинальные суппозитории

Вагинальные суппозитории Кломет - антибактериальное лекарственное средство, применяемое в гинекологии.

Хлоргексидин является антибактериальным веществом широкого спектра действия.

Клотримазол – противогрибковое лекарственное средство. Метронидазол обладает действием, направленным против анаэробных бактерий и трихомонад.

Показания к применению:

Кломет применяется при лечении бактериального вагинита, грибкового кольпита, вагинального трихомониаза и кольпита со смешанными инфекционным характером.

Способ применения:

Вагинальное применение. Перед сном вымыть руки.

Поместить суппозиторий Кломет на кончик пальца и ввести глубоко внутрь влагалища (задний свод).

По одному суппозиторию на одно применение. Курс лечения составляет 7 дней.

Провести повторный курс лечения после первого менструального цикла с момента прекращения применения лекарственного средства.

Побочные действия:

В некоторых случаях при применении свечей Кломет, отмечалось проявление аллергической реакции. Некоторые пациенты отмечали жжение во влагалище.

Противопоказания:

Кломет противопоказан лицам, чувствительным к одному из компонентов данного лекарственного средства.

Не рекомендуется применять препарат, если наблюдаются какие-либо изменения внешнего вида.

Беременность:

Кломет противопоказан беременным женщинам в первые три месяца беременности.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При применении Кломета не используются одновременно другие лекарственные средства для вагинального введения.

Если применяются другие лекарственные средства необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом перед применением данного препарата.

Условия хранения:

Хранить в темном месте, герметично закрытыми, при температуре ниже 30°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска:

Кломет - суппозитории вагинальные.

Упаковано в PVC/PE ламинированную пленку, 7 свечей в блистере, 1 блистер в картонной упаковке.

Состав:

Вагинальные суппозитории Кломет содержат: 200 мг метронидазола, 160 мг клотримазола и 8мг хлоргексидина ацетата; вспомогательный материал включает полусинтетический глицерид, парафин, ланолин достаточное количество.