

Фильтрум 400мг №50 таблетки

Основные физико-химические свойства

таблетки темно-коричневого цвета с серовато-коричневыми вкраплениями, круглой плоскоцилиндрической формы с фаской и риской;

Состав

1 таблетка содержит 400 мг лигнина гидролизного (полифану) в пересчете на 100% вещество;

вспомогательные вещества: повидон, кальция стеарат.

Форма выпуска

Таблетки.

Фармакотерапевтическая группа

Энтеросорбенты. Код АТС А07В С10.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика. Фильтрум – природный энтеросорбент, состоящий из продуктов гидролиза компонентов древесины – полимера лигнина, структурными элементами которого являются производные фенилпропану и гидроцеллюлози.

Проявляет высокую сорбирующую активность и неспецифическое дезинтоксикационное действие.

Связывает и выводит из организма патогенные бактерии и бактериальные токсины, лекарственные препараты, яды, соли тяжелых металлов, алкоголь, аллергены, а также избыток некоторых продуктов обмена веществ, в том числе билирубина, холестерина, мочевины, метаболитов, которые отвечают за развитие эндогенного токсикоза.

Фармакокинетика. Препарат не всасывается, полностью выводится из кишечника в течение 24 час.

Показания для применения

Как дезинтоксикационное средство у взрослых и детей при экзогенных и эндогенных интоксикациях различного происхождения:

острые отравления лекарственными средствами, алкалоидами, солями тяжелых металлов, алкоголем;

комплексное лечение пищевых токсикоинфекций, сальмонеллеза, дизентерии, диспепсии;

гнойно-воспалительные заболевания, сопровождающиеся выраженной интоксикацией;

гипербилирубинемия и гиперазотемия (печеночная и почечная недостаточность);

пищевая и лекарственная аллергия;

профилактика хронических интоксикаций у работников производств с

вредными условиями труда.

Способ применения и дозы

Внутрь, желательно после предварительного измельчения, запивая водой за 1 ч до еды и приема других лекарственных средств.

Доза препарата зависит от возраста, массы тела и тяжести заболевания.

Препарат принимают 3 - 4 раза в день, средняя однократная доза составляет для детей до 1 года – ½ таблетки; 1-3 года – ½ - 1 таблетка; 4 - 7 лет – 1 таблетка; 7 - 12 лет – 1 - 2 таблетки; для взрослых – 2 - 3 таблетки.

При необходимости, по рекомендации врача, суточная доза может быть увеличена до 20 - 30 г за 3 - 4 приема.

Продолжительность лечения при острых состояниях 3 - 5 дней, при аллергических заболеваниях и хронических интоксикациях до 14 - 21 дня.

Повторные курсы лечения спустя 2 недели по рекомендации врача.

Побочное действие

В единичных случаях возможны аллергические реакции, запор.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость препарата. Нежелательно применять препарат при обострении язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, атонии кишечника.

Передозировка

Случаи передозировки не отмечались.

Особенности применения

Препарат может применяться в комплексной терапии с другими лекарственными средствами, при соблюдении правила раздельного приема. Длительное применение может приводить к нарушению всасывания витаминов, кальция, в связи с чем рекомендуется профилактический прием поливитаминов и препаратов кальция.

Препарат можно применять во время беременности и в период кормления грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Возможно снижение лечебного эффекта некоторых лекарств, которые принимаются одновременно.

Условия и срок хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.

Срок годности – 2 года.

Условия отпуска

Без рецепта