

Состав

100 г пасты для приема внутрь содержит:

Действующие вещества: полиметилсилоксана полигидрат (продукт нелинейной поликонденсации 1,1,3,3-тетрагидрокси-1,3-диметилдисилоксана полигидрат) 70 г.

Вспомогательные вещества: вода очищенная - 30 г.

Показания

Энтеросгель применяется у взрослых и детей в качестве детоксикационного средства: острые и хронические интоксикации различного происхождения; острые отравления сильнодействующими и ядовитыми веществами, в том числе, лекарственными препаратами и алкоголем, алкалоидами, солями тяжёлых металлов; острые кишечные инфекции любого генеза в составе комплексной терапии (токсикоинфекции, сальмонеллёз, дизентерия, диарейный синдром неинфекционного происхождения, дисбактериоз); гнойно-септические заболевания, сопровождающиеся выраженной интоксикацией, в составе комплексной терапии; метеоризм; пищевая и лекарственная аллергия; гипербилирубинемия (вирусные гепатиты) и гиперазотемия (хроническая почечная недостаточность); с целью профилактики хронических интоксикаций работникам вредных производств (профессиональные интоксикации химическими агентами политропного действия, ксенобиотиками, инкорпорированными радионуклидами, соединениями свинца, ртути, мышьяка, нефтепродуктами, органическими растворителями, окислами азота, углерода, фторидами, солями тяжёлых металлов).

Применение при беременности и кормлении грудью

Энтеросгель не противопоказан при беременности и в период лактации (грудного вскармливания). Применение у детей возможно с грудного возраста.

Противопоказания

Противопоказанием к применению Энтеросгеля является: повышенная чувствительность к препарату;
желудочно-кишечное кровотечение;
кишечная непроходимость.

Побочные действия

При применении препарата возможны:
отвращение к приему препарата Энтеросгель;
тошнота;
запор;
диарея.

Специальные указания

Меры предосторожности при приеме препарата Энтеросгель можно применять в комплексной терапии с другими лекарственными средствами при соблюдении правила раздельного во времени приема - 1-2 ч до или после приема других препаратов. Результаты опубликованных клинических исследований последних лет (см. Клинические рекомендации "Акушерство и гинекология", 4-е издание, переработанное и дополненное, М. "ГЭОТАР-Медиа", 2014), позволяет рекомендовать препарат Энтеросгель в составе комплексной терапии больных эндометритом и гестационным пиелонефритом. Энтеросгель (полиметилсилоксана полигидрат) обладает выраженными сорбционными и детоксикационными свойствами. В просвете ЖКТ полиметилсилоксана полигидрат связывает и выводит из организма эндогенные и экзогенные токсичные вещества различной природы, включая бактерии и бактериальные токсины, антигены, пищевые аллергены, метаболиты лекарственных препаратов, соли тяжелых металлов. Препарат сорбирует также продукты обмена веществ организма, в т.ч. избыток билирубина, мочевины, холестерина и липидных комплексов, а также метаболиты, ответственные за развитие эндогенного токсикоза. Полиметилсилоксана полигидрат не уменьшает всасывания витаминов и микроэлементов, способствует восстановлению нарушенной микрофлоры кишечника и не влияет на его двигательную функцию.

Взаимодействие с алкоголем

Данных о взаимодействии с алкоголем нет.

Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия хранения

При температуре не ниже 4 °С

Срок годности

3 года