

Форма выпуска

Капли для приема внутрь, сироп.

Состав

Проспан Капли для приема внутрь 1 мл содержит: Активное вещество: экстракт листьев плюща сухой 20 мг; Вспомогательные вещества: масло анисовое, масло фенхеля, масло мяты перечной, натрия сахарин, этанол 47 об.%.
Проспан Сироп 100 мл сиропа содержат: Активное вещество: сухой экстракт листьев плюща (5-7.5:1) 7,00 мг; Вспомогательные вещества: очищенная вода 566,66 мг; калия сорбат 1,34 мг; лимонная кислота безводная 0,50 мг; раствор сорбитола (кристаллизованный) 550,00 мг; камедь ксантана 1,50 мг; вишневый аромат 3,00 мг.

Упаковка Капли - 20, 50 или 100 мл во флаконах-капельницах темного стекла, 1 флакон в картонной пачке.
Сироп 100 или 200 мл во флаконах темного стекла, 1 флакон в картонной пачке.

Фармакологическое действие

Проспан - растительный препарат. Содержит сапонины, тритерпеноиды, флавоноиды. Оказывает противокашлевое, отхаркивающее и спазмолитическое действие. Снижает вязкость мокроты и облегчает ее отхождение. Обладает противомикробной активностью.

Показания к применению

В качестве отхаркивающего средства в терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и легких, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 1 года); алкоголизм и другие состояния, при которых противопоказан прием алкоголя.

Способ применения и дозы Капли для приема внутрь

Внутрь, взрослым и школьникам — по 20 капель, детям 4–7 лет — по 15 капель, детям 1–3 лет по 10 капель 3–5 раз в сутки; маленьким детям рекомендуется принимать капли вместе с медом или фруктовым соком. Ингаляционно: в специальный ингаляционный прибор накапать 20–25 капель, развести питьевой водой комнатной температуры в соотношении 1:2, ингалировать 3–5 раз в день. Нельзя перегревать раствор. Курс лечения в легких случаях — 1 нед, после исчезновения симптомов заболевания еще в течение 2–3 дней.

Сироп

Внутрь, детям 1–6 лет — по 1 ч.ложке (2,5 мл) 3 раза в сутки, школьникам и подросткам — по 2 ч.ложки 3 раза в сутки, взрослым — по 2–3 ч.ложки 3 раза в сутки. Курс лечения в легких случаях — 1 неделя, после исчезновения симптомов заболевания еще в течение 2–3 дней.

Применение при беременности и кормлении грудью

При необходимости применения Проспана при беременности следует соотнести предполагаемую пользу для матери и потенциальный риск для плода. Следует соблюдать осторожность при применении препарата в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия: возможно аллергические реакции.

Особые указания

Пациент должен быть информирован о том, что при отсутствии улучшения необходима консультация врача. В процессе хранения возможно легкое помутнение раствора и незначительное изменение вкуса, что не влияет на терапевтические свойства препарата. Следует учитывать, что препарат в форме капель содержит 47 об.% этанола.

Лекарственное взаимодействие: не установлено клинически значимого взаимодействия препарата Проспан с другими лекарственными средствами.

Передозировка: до настоящего времени о случаях передозировки препарата Проспан не сообщалось.

Условия хранения: препарат следует хранить при комнатной температуре.

Срок годности: 3 года