

Көрсөтмөлөрү

Ципрофлоксацин ага сезимтал козгогучтар тарабынан пайда болгон төмөнкү бактериялык инфекцияларды дарылоодо колдонулат.

Чондор

Грамтерс бактериялардан улам келип чыккан төмөнкү дем алуу жолдорунун инфекциялары:

- өнөкөт обструктивдүү өпкө оорусунун күчөшү;
- кистоздук фиброз же бронхоэктаздар менен коштолгон бронх-өпкө инфекциялары;
- пневмония.

Ортоңку кулактын өнөкөт ириңдүү отити.

Өнөкөт синуситтин күчөшү, айрыкча грамтерс бактериялардан келип чыккан учурларда.

Сийдик чыгаруу жолдорунун инфекциялары.

Жыныс системасынын инфекциялык оорулары:

- сезимтал *Neisseria gonorrhoeae* штаммдары менен шартталган гонококктук уретрит жана цервицит;
- орхоэпидидимит, айрыкча сезимтал *Neisseria gonorrhoeae* штаммдары себеп болгон учурларда;
- жамбаш органдарынын сезгенүү оорулары, айрыкча сезимтал *Neisseria gonorrhoeae* штаммдары менен шартталгандар.

Тамак сиңирүү жолдорунун инфекциялары (мисалы, саякатчылардын диареясы).

Ич көңдөйүнүн (интраабдоминалдык) инфекциялары.

Грамтерс бактериялардан келип чыккан тери жана жумшак ткандардын инфекциялары.

Сырткы кулактын отитинин оор формалары.

Сөөк жана муундардын инфекциялары.

Neisseria meningitidis козгогон инвазиялык инфекциялардын алдын алуу.

Сибирь жарасынын өпкө формасы (контакттан кийин алдын алуу жана радикалдуу дарылоо).

Ципрофлоксацинди нейтропения жана гипертермиясы бар, бактериялык инфекциялык тектүү ысытмага шек саналган бейтаптарды дарылоодо колдонсо болот.

Балдар

Кистоздук фиброз менен коштолгон, көк ириң таякчасы (*Pseudomonas aeruginosa*) козгогон бронх-өпкө инфекциялары;

-татаалдашкан сийдик чыгаруучу жолдордун инфекциялары жана пиелонефрит;

-сибирь жарасынын өпкө формасы (контакттан кийин алдын алуу жана радикалдуу дарылоо).

Дарыгер зарыл деп эсептеген учурда, ципрофлоксацинди балдардагы оор инфекцияларды дарылоодо да колдонууга болот.

Дарылоону кистоздук фиброзду жана/же балдардагы оор инфекцияларды дарылоодо тажрыйбасы бар дарыгер башташы керек (караңыз: «Колдонуу өзгөчөлүктөрү» жана «Фармакологиялык касиеттери» бөлүмдөрү).

Каршы көрсөтмөлөрү

Ципрофлоксацинге, фторхинолондор тобундагы башка препараттарга же дарынын курамындагы кандайдыр бир жардамчы затка жогорку сезимталдык.

Ципрофлоксацинди тизанидин менен бир убакта колдонууга болбойт (караңыз: «Башка дары каражаттары менен өз ара аракеттенүүсү жана өз ара аракеттенүүнүн башка түрлөрү»).

Колдонуу ыкмасы жана дозалары

Доза көрсөткүчтөргө, инфекциянын оордугуна жана жайгашкан жерине, козгогучтун (козгогучтардын) ципрофлоксацинге сезимталдыгына, бейтаптын бөйрөк функциясына жараша аныкталат, ал эми балдарда – дене салмагына ылайык эсептелет.

Дарылоонун узактыгы оорунун оордугуна, клиникалык көрүнүштөрүнө жана козгогучтун түрүнө жараша болот.

Ашыкча доза

12 г дарыны кабыл алуудан улам ашыкча дозалануу орточо уулануу белгилерине алып келгени билдирилген. 16 г дозада курч бөйрөк жетишсиздиги (КБЖ) өнүккөн.

Ашыкча дозанын белгилерине баш айлануу, тремор, баш оору, чарчоонун күчөшү, тырышуулар, галлюцинациялар, аң-сезимдин чаташуусу, ич көңдөйүндөгү дискомфорт, бөйрөк жана боор жетишсиздиги, ошондой эле кристаллурия жана гематурия кирет. Ошондой эле кайтарымдуу бөйрөк токсикалуулугу байкалганы айтылган.

Ашыкча дозаланууда жүргүзүлүүчү стандарттуу шашылыш чаралардан тышкары, бөйрөк функциясын көзөмөлдөө, анын ичинде зааранын pH деңгээлин аныктоо жана зарыл болсо кристаллуриянын алдын алуу үчүн заараны кычкылдандыруу сунушталат. Бейтаптар жетиштүү суюктук алышы керек. Курамында кальций же магний бар антациддер ашыкча дозада ципрофлоксациндин сиңишин теориялык жактан төмөндөтүшү мүмкүн. Гемодиализ же перитонеалдык диализ аркылуу ципрофлоксациндин аз гана бөлүгү (<10%) чыгарылат.

Ашыкча дозаланууда симптомдук дарылоо жүргүзүлөт. QT интервалын узартуу мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу ЭКГ-мониторинг жүргүзүү да максатка ылайыктуу.

Кош бойлуулук жана эмчек эмизүү мезгилинде колдонуу

Кош бойлуулук.

Кош бойлуу аялдарда ципрофлоксацинди колдонуу боюнча маалыматтар тубаса кемтиктердин же фето-неонаталдык токсикалуулуктун өнүгүүсү

байкалбаганын көрсөтөт. Ошого карабастан, түйүлдүккө мүмкүн болуучу терс таасирлердин алдын алуу максатында кош бойлуулук учурунда ципрофлоксацинди колдонбоо сунушталат.

Жаш жаныбарларда жана төрөлгөнгө чейин хинолондордун таасирине дуушар болгон жаныбарларда жетилбеген кемирчек ткандарына таасир эткени байкалгандыктан, препарат түйүлдүктүн же жаңы төрөлгөн ымыркайдын муун кемирчектерине зыян келтириши мүмкүн деген коркунучту жокко чыгарууга болбойт.

Эмчек эмизүү мезгили.

Ципрофлоксацин эмчек сүтүнө өтөт. Жаңы төрөлгөн баланын муун кемирчектерине зыян келтирүү коркунучуна байланыштуу, ципрофлоксацинди эмчек эмизүү мезгилинде колдонууга болбойт.

Балдар

Балдарга жана өспүрүмдөргө ципрофлоксацинди колдонуу учурдагы расмий сунуштарга ылайык жүргүзүлүшү керек. Дарылоону кистоздук фиброз жана/же оор инфекциялары бар балдарды жана өспүрүмдөрдү дарылоодо тажрыйбасы бар дарыгер жүргүзүшү зарыл.

Автотранспорттуу же механизмдерди башкарууга таасири

Ципрофлоксацин нерв системасы тарабынан пайда болгон реакцияларга байланыштуу (караңыз: «Терс реакциялар») автотранспорттуу башкаруу жана механизмдер менен иштөө жөндөмүнө таасир этиши мүмкүн. Ошондуктан мындай иш-аракеттерди аткаруу жөндөмү бузулушу ыктымал.

Курамы

Пленка менен капталган 1 таблеткада ципрофлоксацин 500 мг бар.

Активдүү заты: ciprofloxacin.

Жардамчы заттары: микрокристаллдык целлюлоза, жүгөрү крахмалы, кросповидон, суусуз коллоиддик кремний диоксиди, магний стеараты.

Каптама: гидроксипропилметилцеллюлоза, полиэтиленгликоль 6000, титандын диоксиди (E171).

Сактоо шарттары

25 °C жогору эмес температурада, оригиналдуу таңгакта сакталсын.

Балдардын колу жетпеген жерде сакталсын.

Жарамдуулук мөөнөтү

3 жыл.