

Компоненттердин касиеттери

Боровая матка (ортилия однобокая) – *Ortilia secunda*

Боровая матка (ортилия однобокая) элдик медицинанын тажрыйбасында гинекологиялык сезгенүү ооруларын дарылоодо кеңири колдонулат.

Биологиялык активдүү заттардын таасири менен боровая матканын чөбү заара-жыныс системасынын функциясын жакшыртат, заара кубалатуучу таасирге ээ, простата безинин, бөйрөктүн жана заара куыгынын сезгенүү процесстеринде натыйжалуу.

Клиникалык изилдөөлөргө ылайык, боровая матканын чөбү аялдардын жана эркектердин заара-жыныс системасына байланыштуу сезгенүү процесстерин эки эсе ылдамыраак жоюуга жардам берет.

Боровая матка төмөнкү учурларда натыйжалуу колдонулат: тукумсуздук, жатын моюнчасынын эрозиясы, этек кир циклындагы бузулуулар, кош бойлуулуктагы токсикоз, жатындын миомасы, өзгөчө көп кан кетүү учурларында.

Чөбүнүн антисептикалык жана сезгенүүгө каршы таасири арбутин гидролизи учурунда ферменттер менен кислоталардын таасири астында организмде бөлүнүп чыккан гидрохинон менен байланыштуу. Арбутин бөйрөк эпителийин дүүлүктүрүп, заара кубалатуучу таасир көрсөтөт. Дарылоочу таасир флавоноиддердин, дубильдик заттардын жана алардын гидролиз продуктуларынын өзгөчө таасири менен күчөйт.

Колдонууга көрсөтмөлөр:

- Гинекологиялык сезгенүү оорулары
- Заара чыгаруучу системанын сезгенүү оорулары
- Простата безинин оорулары

Колдонууга каршы көрсөтмөлөр:

Кош бойлуу жана эмизип жаткан аялдарга, ошондой эле БАК (биологиялык активдүү кошумча) компоненттерине жекече чыдамсыздык болгондо колдонууга сунушталбайт.

Кыйыр таасирлер:

Аллергиялык реакциялар.

Колдонуу ыкмасы жана дозасы:

1 аш кашык чөптү 1 стакан кайнак сууга салып, 10–15 мүнөт караңгы жерде демдеп коёсуз, андан соң сүзүп аласыз. Тамак учурунда күнүгө 2–3 жолу 1/2–1/3 стакандан ичүү сунушталат.

Аптекалардан чыгаруу шарттары:

Рецептсиз