

Лекарственная форма

Капли для приёма внутрь, 100 мл

Состав

100 г препарата содержат:

активные вещества:

Водно-спиртового экстракта 29.0 г (экстрагент: этанол 59 % (об/об)) из:

Алтея корня 0.4 г

Ромашки цветков 0.3 г

Хвоща травы 0.5 г

Ореха грецкого листьев 0.4 г

Тысячелистника травы 0.4 г

Дуба коры 0.2 г

Одуванчика лекарственного травы 0.4 г

вспомогательные вещества:

вода очищенная 71.0 г

Описание

Прозрачная или слегка мутноватая жидкость, желто-коричневого цвета, с характерным запахом ромашки. При хранении возможно выпадение осадка.

Показания к применению

- профилактика и лечение острых и хронических заболеваний верхних дыхательных путей (тонзиллит, фарингит, ларингит)
- профилактика осложнений при респираторных вирусных инфекциях и как дополнение к терапии антибиотиками при бактериальных инфекциях.

Способ применения и дозы

При острых заболеваниях

Взрослые и дети старше 12 лет принимают по 25 капель 5-6 раз в день.

Дети школьного возраста (6-12 лет) принимают по 15 капель 5-6 раз в день.

Дети дошкольного возраста (2-5 лет) принимают по 10 капель 5-6 раз в день.

После исчезновения острых симптомов следует продолжить лечение в течение еще не менее одной недели.

После исчезновения острых симптомов:

Взрослые и дети старше 12 лет принимают по 25 капель 3 раза в день.

Дети школьного возраста (старше 6 лет) принимают по 15 капель 3 раза в день.

Дети дошкольного возраста (старше 2 лет) принимают по 10 капель 3 раза в день.

Капли принимают в неразбавленном виде, подержав их некоторое время во рту перед проглатыванием. При дозировании держите флакон в вертикальном положении. Перед употреблением взбалтывать.

Побочные действия возможны:

- нарушения желудочно-кишечного тракта
- аллергические реакции

При первых признаках аллергической реакции следует прекратить прием капель Тонзилгон® Н.

Противопоказания

- индивидуальная повышенная чувствительность к какому - либо из компонентов лекарственного препарата
- известная аллергия на растения семейства сложноцветных, например полынь, тысячелистник, хризантему, маргаритку, из-за так называемых перекрестных реакций на цветки ромашки.
- детский возраст до 2 лет

Особые указания

Данный лекарственный препарат содержит 19 % (о/о) спирта. Препарат не должен приниматься пациентами, страдающими алкоголизмом, или теми, кто успешно завершил курс лечения от алкоголизма. Содержание алкоголя должно приниматься во внимание у пациентов группы высокого риска, таких как пациенты с заболеваниями печени или эпилепсией. Если симптомы сохраняются или появляется одышка, лихорадка, гнойная или кровянистая мокрота, проконсультируйтесь с врачом. При использовании флакон держите в вертикальном положении.

Беременность и период лактации

Из-за отсутствия достаточных данных в период беременности и кормления грудью не рекомендуется применять препарат в этот период.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения 2 года Период применения после вскрытия флакона 6 месяцев.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта