

Описание товара:

Биологически активная добавка к пище «ЦЕВИМЕД, капли витамина С для приема внутрь», раствор для детей с 1,5 года – является дополнительным источником Витамина С.

Характеристика БАД к пище: Капли для приема внутрь – прозрачная или светло-жёлтая жидкость, кисло-сладкая на вкус.

Состав: аскорбиновая кислота, глицерин безводный, вода очищенная.

1 капля содержит 5 мг аскорбиновой кислоты. 1 мл = 20 капель

Основной компонент в биологически активной добавке «ЦЕВИМЕД, капли витамина С для приема внутрь» аскорбиновая кислота.

Витамин С относится к соединениям, которые играют чрезвычайно важную роль в нашем организме. Хотя это в первую очередь связано с его благотворным воздействием на иммунитет, на самом деле его преимущества безусловно, больше.

Витамин С преимущества

- поддерживает иммунитет организма;
- обладает антиоксидантной активностью;
- поддерживает работу системы кровообращения;
- влияет на укрепление опорной системы;
- увеличивает поглощение железа из рациона/добавок;
- поддерживает процессы заживления ран.

Показания Профилактика гипо- и авитаминоза С.

Состояния повышенной потребности в Аскорбиновой кислоте:

- период искусственного вскармливания и интенсивного роста;
- несбалансированное питание;
- повышенные умственные и физические нагрузки; период реконвалесценции после тяжелых заболеваний;

ожоговая болезнь, в составе комплексной терапии: лихорадочное состояние на фоне ОРЗ, ОРВИ;

длительно текущие хронические инфекции.

Рекомендации по применению Детям от 1,5 – 3 лет назначают по 9-10 капель (45 мг-50 мг) 1 раз в день.

Детям от 3 до 7 лет назначают по 10-12 капель (50-60 мг) 1 раз в день. Детям от 7 до 14 лет назначают: мальчики – по 12-14 капель (60-70 мг) 1 раз в день. Девочки – по 12 капель (60 мг) 1 раз в день.

Детям старше 14 лет назначают по 14-15 капель (70-90 мг) 1 раз в день.

Взрослым (старше 18 лет) назначают по 20 капель (100 мг) 1 раз в день.

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Рекомендации для женщин в период беременности и грудного вскармливания

Беременным (I-III триместр) назначают по 22 капли (110 мг) 1 раз в день.

Продолжительность приёма: 20-30 дней

При необходимости, курс можно продлить или повторить после консультации с врачом.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов БАД.