

Курамы

Ичке кабыл алуу үчүн пастанын 100 г курамында:

Активдүү зат: полиметилсилоксандын полигидраты (1,1,3,3-тетрагидрокси-1,3-диметилдислоксан полигидратынын сызыктуу эмес поликонденсациясынын продуктысы) - 70 г.

Көмөкчү зат: тазаланган суу - 30 г.

Көрсөтмөлөр

Энтеросгель чоңдордо жана балдарда детоксикациялоочу каражат катары колдонулат: ар кандай келип чыгыштагы курч жана өнөкөт интоксикациялар; күчтүү таасир этүүчү жана уулуу заттар менен курч уулануулар, анын ичинде дары-дармектер жана алкоголь, алкалоиддер, оор металлдардын туздары; ар кандай генездеги курч ичеги инфекциялары комплекстүү терапиянын курамында (токсикоинфекциялар, сальмонеллёз, дизентерия, инфекциялык эмес келип чыгыштагы диареялык синдром, дисбактериоз); айкын интоксикация менен коштолгон ириңдүү-септикалык оорулар комплекстүү терапиянын курамында; метеоризм; тамак-аш жана дары-дармекке болгон аллергия; гипербилирубинемия (вирустук гепатиттер) жана гиперазотемия (өнөкөт бөйрөк жетишсиздиги); зыяндуу өндүрүштөрдө иштеген кызматкерлерде өнөкөт интоксикациялардын алдын алуу максатында (политроптук таасирдеги химиялык агенттер менен кесиптик интоксикациялар, ксенобиотиктер, организмге сиңген радионуклиддер, коргошун, сымап, мышьяк кошундулары, мунай продуктулары, органикалык эриткичтер, азот жана көмүртек оксиддери, фториддер, оор металлдардын туздары).

Кош бойлуулук жана эмчек эмизүү мезгилинде колдонуу

Энтеросгель кош бойлуулукта жана лактация мезгилинде (эмчек эмизүүдө) каршы көрсөтүлгөн эмес. Балдарда колдонуу эмчек курактан баштап мүмкүн.

Каршы көрсөтмөлөр

Энтеросгелди колдонууга каршы көрсөтмөлөр: препаратка жогорку сезимталдык; ашказан-ичеги жолунан кан кетүү; ичеги өтпөстүгү.

Кыйыр таасирлер

Препаратты колдонууда төмөнкүлөр мүмкүн:
Энтеросгелди кабыл алууга жек көрүү (жийиркенүү);
жүрөк айлануу;
ич катуу;
ич өтүү.

Атайын көрсөтмөлөр

Сактык чаралары: Энтеросгелди башка дары каражаттары менен комплекстүү

терапияда колдонууга болот, бирок кабыл алууну убакыт боюнча бөлүү эрежесин сактоо зарыл — башка препараттарды кабыл алуудан 1–2 саат мурда же кийин. Акыркы жылдары жарыяланган клиникалык изилдөөлөрдүн жыйынтыктары (караңыз: Клиникалык сунуштамалар «Акушерство жана гинекология», 4-басылышы, кайра иштелип чыккан жана толукталган, М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2014) эндометрит жана гестациялык пиелонефрит менен ооругандарда комплекстүү терапиянын курамында Энтеросгельди сунуштоого мүмкүндүк берет.

Энтеросгель (полиметилсилоксандын полигидраты) айкын сорбциялык жана детоксикациялоочу касиеттерге ээ. Ичеги-карын жолунун люменинде полиметилсилоксандын полигидраты эндогендик жана экзогендик ар кандай табияттагы уулуу заттарды, анын ичинде бактерияларды жана бактериялык токсиндерди, антигендерди, тамак-аш аллергендерин, дары-дармектердин метаболиттерин, оор металлдардын туздарын байлап, организмден чыгарат. Препарат ошондой эле организмдин алмашуу продуктуларын, анын ичинде билирубиндин, мочевинын, холестериндин жана липиддик комплекстердин ашыкча көлөмүн, ошондой эле эндогендик токсикоздун өнүгүшүнө жооптуу метаболиттерди сорбциялайт. Полиметилсилоксандын полигидраты витаминдердин жана микроэлементтердин сиңишин азайтпайт, ичеги микрофлорасынын бузулган балансын калыбына келтирүүгө көмөктөшөт жана анын кыймылдаткыч функциясына таасир этпейт.

Алкоголь менен өз ара аракеттениши

Алкоголь менен өз ара аракеттениши жөнүндө маалыматтар жок.

Дарыканадан чыгаруу шарттары

Препарат рецептсиз берилүүчү каражат катары колдонууга уруксат берилген.

Сактоо шарттары

4 °Стен төмөн эмес температурада сактоо.

Жарамдуулук мөөнөтү

3 жыл.