

Курамы

Бир таблетканын курамында активдүү заттар:

лидокаин гидрохлориди - 1,0 мг,

хлоргексидин диглюконаты - 1,0 мг,

иротрицин - 0,5 мг.

Кошумча заттар:

Сорбитол, магний стеараты, жалбыз майы.

Сүрөттөлүшү

Таблеткалар ак түстө, тегерек формада, бети жалпак, жээги кыйшайган, диаметри $(13,0 \pm 0,2)$ мм жана бийиктиги $(4,0 \pm 0,2)$ мм.

Колдонууга көрсөтмөлөр

-ооз көңдөйүнүн жана жуткунчактын сезгенүү жана жугуштуу оорулары (стоматит, гингивит, пародонтит, глоссит, тонзиллит, фарингит жана жутуунун кыйындашы менен коштолгон башка абалдар);

-ооз көңдөйүндө жана жуткунчакта операциялык кийлигишүүдөн мурда жана кийин жугушту алдын алуу (тиш жулдуруу, тиш этине хирургиялык дарылоо, тонзиллэктомия).

Колдонуу ыкмасы жана дозалары

Трахисан - соруп ичилүүчү таблеткалар. Ар 2 саат сайын 1 таблеткадан кабыл алуу керек.

Чоңдор жана 12 жаштан жогору балдар үчүн суткалык доза - 8 таблетка,

6 жаштан 12 жашка чейинки балдар үчүн - 6 таблетка.

Оорунун белгилери бир нече күндөн кийин жоголот, бирок туруктуу дарылык таасирге жетүү үчүн терапияны дагы 2-3 күн улантуу сунушталат. Эгер препаратты колдонгондон кийин 5 күндүн ичинде абал жакшырбаса, дарылоо тактикасын өзгөртүү керек.

Кыйыр таасирлери

-даам сезүүнүн кыска мөөнөттүү өзгөрүшү, тилдин уюшу, кыска убакытта өзүнөн өзү жоголот;

-тиштердин, тиш пломбаларынын жана протездердин же тилдин сары же ачык күрөң түскө бир аз боёлушу, муну ооз көңдөйүнүн гигиенасы аркылуу жоюуга болот. Препаратты токтоткондон кийин боёлуу өзүнөн өзү жоголот.

Каршы көрсөтмөлөр

-препараттын кайсы бир курамдык бөлүгүнө жогорку сезимталдык;

-ооз көңдөйүнүн былжыр челинин жабыркашы (эрозия);

-ооз жана жуткунчак көңдөйүндөгү ачык жаралар;

-6 жашка чейинки балдар.

Дары-дармектик өз ара аракеттенүүлөр

Азыркы учурга чейин белгисиз.

Өзгөчө көрсөтмөлөр

Препаратты кант диабети менен жабыркаган бейтаптар колдонсо болот.

Кош бойлуулук жана эмчек эмизүү мезгили

Кош бойлуулук жана эмчек эмизүү мезгилинде препаратты колдонуу эненин күтүлгөн пайдасы түйүлдүккө же балага тийгизилиши мүмкүн болгон коркунучтан жогору болгондо гана мүмкүн.

Дары каражатынын транспорт каражаттарын башкарууга же потенциалдуу кооптуу механизмдер менен иштөөгө таасири

Таасир этпейт.

Сактоо шарттары

25 °Стен жогору эмес температурада сактоо керек. Балдардын колу жетпеген жерде сактаңыз!

Сактоо мөөнөтү

3 жыл. Жарамдуулук мөөнөтү өткөндөн кийин колдонбоңуз.

Дарыканадан берилүү шарттары

Рецептсиз берилет.