

Нимесил® (нимесулид) 100 мг

Ооз аркылуу кабыл алуу үчүн суспензия даярдоого арналган гранулалар.

Фармакотерапиялык тобу:

Стероиддик эмес сезгенүүгө каршы дары (СЭСД).

Көрсөтмөлөр:

Курч ооруларды дарылоо (бел жана арка оорулары, таяныч-кыймыл аппаратынын оорулары, жаракаттар, байламталардын сунулушу, муундардын чыгышы, тендинит, бурсит, тиш ооруу);

Оору синдрому менен коштолгон остеоартрозду симптоматикалык дарылоо; Альгодисменорея.

Препарат симптоматикалык терапия үчүн колдонулат.

Колдонуу ыкмасы жана дозасы:

Чоңдорго жана 12 жаштан жогору өспүрүмдөргө:

1 пакеттен (100 мг) күнүнө 2 жолу.

Пакеттин мазмунун 100 мл сууга эритип, тамактан кийин ичүү.

Дарылоонун максималдуу узактыгы:

15 күнгө чейин.

Каршы көрсөтмөлөр:

-Нимесулидге жогорку сезгичтик;

-Ашказан-ичеги трактынын эрозиялык-жара оорулары;

-Оор даражадагы бөйрөк жетишсиздиги;

-Кош бойлуулук жана эмчек эмизүү мезгили;

-12 жашка чейинки балдар.

Терс таасирлери:

Жүрөк айлануу, кусуу, диарея, ич ооруу, баш айлануу, баш оору, аллергиялык реакциялар, артериялык кан басымдын жогорулашы, боор жана бөйрөк функциясынын бузулушу (сейрек).

Чыгаруу формасы:

Ооз аркылуу кабыл алуу үчүн суспензия даярдоого арналган гранулалар.

Сактоо шарттары:

25 °Стен жогору эмес температурада, кургак жана жарыктан корголгон жерде сактоо.

Жарамдуулук мөөнөтү: 2 жыл.

Берилиши: рецепт менен.