

Показания

Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта, горла, гортани: тонзиллит; фарингит; ларингит (в т.ч. профессионального характера - у преподавателей, дикторов, работников химической и угольной промышленности); охриплость; воспаление слизистой оболочки полости рта и десен (афтозный стоматит, гингивит, молочница).

Способ применения

Рекомендуется взрослым и детям старше 5 лет. Рассасывать по 1 табл. каждые 2-3 ч. Не принимать более 8 табл. в течение 24 ч.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст до 6 лет.

Передозировка

Симптомы: передозировка маловероятна. Возможная передозировка может привести к дискомфорту со стороны ЖКТ (тошнота). Лечение: симптоматическое, под контролем врача.

Особые указания

При случайном пропуске одного или нескольких приемов дозу не повышают.

Побочные действия

Аллергические реакции (сыпь; чувство жжения или покалывания в горле, отек горла).

Применение при беременности/кормлении грудью

Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания возможно только под контролем врача.

Лекарственное взаимодействие

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не выявлено. Возможно одновременное применение препарата с другими местными противомикробными средствами.