

Лекарственная форма: капсулы 3,5 мг.

Состав: 1 капсула содержит лиофилизированный лизат бактерий 3,5 мг; вспомогательные вещества - натрия глутамат, магния стеарат, маннитол, кукурузный крахмал.

Описание: белые непрозрачные желатиновые капсулы с голубой крышкой. Содержимое устойчиво к кислой среде желудка, абсорбируется в толстом кишечнике. Антиген захватывается APC-клетками, стимулирует образование секреторного IgA на слизистых дыхательных путей, обеспечивая повышенную защиту от бактериальных и вирусных инфекций.

Фармакодинамика

Препарат содержит лизаты бактерий, наиболее часто вызывающих инфекции дыхательных путей: *Diplococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella ozaenae*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *Neisseria catarrhalis*.

Бронхо-Мунал модулирует иммунный ответ:

- активирует альвеолярные макрофаги и продукцию противовоспалительных цитокинов;
- увеличивает число циркулирующих Т-лимфоцитов;
- стимулирует периферические моноциты;
- повышает уровень секреторного IgA;
- усиливает продукцию защитных адгезивных молекул;
- снижает уровень IgE - факторов гиперчувствительности;
- уменьшает частоту, продолжительность и тяжесть инфекций дыхательных путей и потребность в антибиотиках.

Показания к применению

Комплексная терапия заболеваний дыхательных путей.

Профилактика рецидивирующих инфекций верхних и нижних дыхательных путей: хронический бронхит, тонзиллит, фарингит, ларингит, ринит, синусит, отиты.

Способ применения и дозы

Взрослые и дети старше 12 лет

Профилактика:

1 капсула в сутки 10 дней, повторять 3 месяца подряд с интервалом 20 дней между курсами.

Острая фаза инфекции:

1 капсула в сутки 10-30 дней; затем по 1 капсуле 10 дней в каждом из следующих двух месяцев (между курсами - 20 дней).

При назначении антибиотика препарат применяют параллельно.

Дети от 6 месяцев до 12 лет (Бронхо-Мунал П)

Профилактика:

1 капсула в сутки 10 дней, 3 месяца подряд, с 20-дневными интервалами.

Острая фаза:

1 капсула в сутки 10-30 дней; далее - по 1 капсуле 10 дней в каждом из двух последующих месяцев.

При необходимости антибиотикотерапии применяют совместно с антибиотиком.

Для детей, не способных проглотить капсулу: содержимое смешать с небольшим количеством чая, молока или сока.

Приём: утром натощак.

Побочные действия

Возникают редко, обычно лёгкие и кратковременные:

- желудочно-кишечные расстройства (боль в животе, тошнота, рвота, диарея);
- повышение температуры;
- редкие реакции гиперчувствительности.

Противопоказания

- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- возраст до 6 месяцев.

Лекарственные взаимодействия

Не выявлены.

Особые указания

Соблюдать интервал не менее 4 недель между приёмом живых вакцин и Бронхо-Муналом.

Применение при беременности и лактации: данных о безопасности недостаточно.

I триместр - не рекомендуется.

II–III триместры - только после оценки соотношения польза/риск.

При приёме в период лактации - прекратить грудное вскармливание.

Не влияет на управление транспортом и механизмами.

Передозировка

Не зарегистрирована.

Форма выпуска

Бронхо-Мунал П: капсулы 3,5 мг, по 10 шт. в блистере; по 1 блистеру в картонной упаковке.

Условия хранения

Хранить при температуре ниже +25 °С;

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 5 лет.

Не использовать после даты, указанной на упаковке.