

Курамы

Таасир этүүчү заттар:

- Амоксициллин – 875 мг
- Клавулан кислотасы – 125 мг

Жардамчы заттар:

- Натрий крахмал гликолят
- Микрокристаллдык целлюлоза
- Коллоиддик кремний диоксиди
- Магний стеараты

Сүрөттөлүшү

Ак түстөгү, пленка каптама менен капталган, томпок, узун формадагы таблеткалар. Бир бетинде чийик, экинчи бетинде DEVA деген жазуу бар.

Фармакотерапиялык тобу

Системалуу колдонуу үчүн антибактериалдык каражаттар. Бета-лактамаза ингибиторлору менен бирге пенициллиндер.

Клавулан кислотасы + амоксициллин

АТХ коду: J01CR02

Фармакологиялык касиеттери

Фармакодинамикалык касиеттери

Амоксициллин – грамон жана грамтерс микроорганизмдерге каршы кеңири спектрге ээ жарым синтетикалык антибиотик. Бирок амоксициллин β-лактамаза энзиминин таасиринен бузулат жана бул заттарды бөлүп чыгарган микроорганизмдерге каршы өз алдынча натыйжасыз.

Клавулан кислотасы – түзүлүшү боюнча пенициллиндерге окшош β-лактама жана ал β-лактамаза энзимдеринин кеңири спектрин дезактивациялоого жөндөмдүү. Бул энзимдер, адатта, пенициллиндерге жана цефалоспориндерге туруктуу микроорганизмдерде болот. Өзгөчө, плазмида аркылуу берилип жаткан β-лактамазаларга каршы жакшы активдүүлүккө ээ.

Клавулан кислотасы амоксициллинди β-лактамазанын бузуу таасиринен коргоп, анын антибактериалдык спектрин кеңейтет. Бул АМОКЛАВИНди кеңири спектрдеги, бактерияларды жок кылуучу жана β-лактамаза ингибитору катары колдонууга мүмкүнчүлүк берет.

Клавулан кислотасы өз алдынча антибактериалдык таасирге ээ эмес, бирок амоксициллин менен бирге колдонулганда бактерияларга каршы күчтүү айкалыш түзөт.

Колдонууга көрсөтмөлөр:

-Жогорку дем алуу жолдорунун инфекциялары (ЛОР оорулары): кайталануучу тонзиллит, синусит, ортоңку отит

-Төмөнкү дем алуу жолдорунун инфекциялары: өнөкөт бронхиттин күчөшү, бронхопневмония

-Заара-жыныс системасынын инфекциялары: цистит, уретрит, пиелонефрит, аялдардын жыныс органдарынын инфекциялары, гонорея

-Тери жана жумшак ткандардын инфекциялары

-Сөөктөрдүн жана муундардын инфекциялары: остеомиелит

-Тиш инфекциялары: дентальвеолярдык абсцесс

-Башка инфекциялар: септикалык аборт, төрөттөн кийинки сепсис, ич көңдөйүнүн сепсиси

Колдонууга каршы көрсөтмөлөр:

-Пенициллиндерге же препараттын башка компоненттерине жекече сезгичтик

- Башка β-лактамыдык антибиотиктерге (цефалоспориндер, карбапенемдер, монобактамыдар) аллергия
- Амоксициллин-клавулан кислотасынын айкалышынан келип чыккан сарык же боор функциясынын бузулушу
- 12 жашка чейинки балдар же салмагы 40 кгдан аз болгон балдар (бул курактык топко дарынын суспензия түрү сунушталат)

Кош бойлуулук жана эмизүү мезгили

Кош бойлуулук:

Айрыкча кош бойлуулуктун биринчи триместринде, дарыны колдонуу зарылдыгы дарыгердин баалоосу менен гана аныкталат.

Эмизүү:

Амоксициллин/клавулан кислотасы кош бойлуу жана эмизүү учурунда дарыгердин пайдасы жана коркунучу боюнча баалоосунан кийин гана колдонулат.

Дозасы жана колдонуу ыкмасы:

Дозасы / Колдонуу узактыгы

Чондор жана 12 жаштан жогорку балдар:

-Жеңил жана орточо оор инфекциялар: 625 мг таблетка, күнүнө 2 жолу

-Оор инфекциялар: 1 г таблетка, күнүнө 2 жолу

Дарылоо парентералдуу түрдө башталып, андан кийин оозеки колдонууга өтүүгө болот.

Тиш инфекциялары (мисалы, дентальвеолярдык абсцесс):

-625 мг күнүнө 2 жолу, 5 күн бою.

Эскертүү: АМОКЛАВИН 625 мг жана 1 г таблеткалары 12 жашка чейинки балдарга арналган эмес.

Колдонуу ыкмасы:

Таблеткаларды бөлбөй, бүт бойдон жутуу керек. Зарыл болгон учурда экиге бөлүп, чайнабай жутууга болот. Таблетканы тамак менен бирге же тамактын башында ичүү керек, анткени бул ашказан-ичеги жолундагы терс таасирлерди азайтат жана сиңүү натыйжалуулугун жогорулатат.

Дарылоо курсу 14 күндөн ашпоого тийиш. Узак мөөнөттүү колдонууда кайра дарыгердин текшерүүсү талап кылынат.

Сактоо мөөнөтү:

24 ай

Сактоо шарттары:

Кургак жерде, 25°C төмөн температурада сактоо керек.

Дарыканадан берилүү шарты:

Рецепт менен