

Курамы:

Бир таблетка төмөнкүдөй курамда болот:

Таасир этүүчү зат – Висмут трикалий дицитраты – 304,6 мг, висмут оксиди (Bi_2O_3) менен эсептегенде – 120 мг.

Жардамчы заттар: жүгөрү крахмалы, магний стеараты, макрогол 6000, повидон К30, калий полиакрилин.

Каптаманын курамы – опадрай ОУ-S-7366, гипромеллоза 5 мПа·с, макрогол 6000.

Сүрөттөлүшү:

Ак же каймак түстөгү, эки жакка томпок формалуу, "gbr 152" деген жазуусу бар, бир жагында жана экинчи жагы тегиз, жыты жок же аммиак жыттуу капталган таблеткалар.

Фармакотерапевтикалык тобу:

Ичеги-карын жараларын жана гастроэзофагеалдык рефлюксту (GERD) дарылоочу башка каражаттар.

Фармакологиялык касиеттери:

Фармакокинетикасы:

Синүү (абсорбция):

Де-Нол – бети активдүү зат. Висмуттун организмге сиңиши өтө аз (0,2%дан аз).

Таралышы:

Висмут негизинен бөйрөккө топтолот, калган органдарда изи гана байкалат.

Биотрансформация:

Ашказанда эрибеген висмут комплексинин туздары – оксихлорид жана цитрат түрүндө топтолот.

Чыгуу:

Ичээр аркылуу организмден чыгат. Заара менен бөлүнүү клиренси болжол менен 50 мл/мүн. Жарым ажыралуу мезгили 5–11 күн.

Фармакодинамикасы:

Де-Нол – жарага каршы, *Helicobacter pylori* бактериясына каршы бактерициддик касиетке ээ каражат. Ошондой эле сезгенүүгө каршы жана жабыштыруучу таасир берет.

Ашказандын кычкыл чөйрөсүндө висмуттун эрибеген оксихлориди жана цитраты пайда болуп, жабыркаган жердин бетинде коргоочу кабык түзөт. Простагландин Е синтезин, былжырдын жана гидрокарбонаттын бөлүнүшүн күчөтөт, коргоочу механизмдерди активдештирет.

Пепсин, туз кислотасы жана башка таасирлерге каршылыкты жогорулатат. Жара жеринде эпидермалдык өсүү фактору жыйналат. Пепсиндин жана пепсиногендин активдүүлүгүн төмөндөтөт.

Колдонууга көрсөтмөлөр:

Ашказан жана он эки эли ичеги жарасы (*Helicobacter pylori* менен байланышкан учурларды кошо)

Созулма гастрит жана гастродуоденит (оорунун күчөгөн фазасында)

Диарея менен коштолгон дүүлүгүүчү ичеги синдрому

Органикалык эмес себеби бар функционалдык диспепсия

Колдонуу ыкмасы жана дозасы:

Ичүү аркылуу.

Чондор жана 12 жаштан жогору балдар:

1 таблеткадан – күнүнө 4 жолу (тамактан 30 мүнөт мурда жана уктар алдында) же

2 таблеткадан – күнүнө 2 жолу (тамактан 30 мүнөт мурда)
Максималдуу бир жолку доза – 240 мг, күнүмдүк доза – 480 мг.
6–12 жаштагы балдар:

Салмагы 40 кг аз болсо – күнүнө 1 таблетка

Салмагы 40 кг жогору болсо – күнүнө 2 жолу 1 таблеткадан

Таблетканы тамактан 30 мүнөт мурда аз сууга ичип алуу керек.

Дарылоо курсу: 4–8 жума.

Анан 8 жуманын ичинде висмут камтыган башка каражаттарды колдонууга болбойт.

Helicobacter pylori дарылоо үчүн Де-Нолду антибиотиктер жана протон помпасын бөгөттөгүчтөр менен айкалыштырып колдонуу сунушталат (квадротерапия).

Жагымсыз таасирлери:

Өтө кеңири таралган (1/10):

Ичеги-карын: кандай түстөгү заң. Бул висмут сульфиди менен байланыштуу жана зыянсыз.

Сейрек (1/1000 – <1/100):

Кусуу, жүрөк айлануу, ичи өтүү же катуу.

Териде:

Териге сыпырылып чыгуу, кычышуу (аллергиялык реакциялар)

Өтө сейрек (<1/10000):

Иммундук реакциялар: анафилаксиялык реакциялар

Узак колдонууда – висмуттун топтолушуна байланыштуу энцефалопатия

Каршы көрсөтмөлөр:

Дарынын курамына жекече сезгичтик

Созулма бөйрөк жетишсиздиги

Кош бойлуулук жана эмизүү мезгили

6 жашка чейинки балдар

Дарылар менен өз ара аракеттенүүсү:

Де-Нол ичкенден кийин 30 мүнөт ичинде башка дары-дармектерди, сүт, мөмө-жемиш, мөмө ширеси жана антациддерди ичүүгө болбойт.

Бул заттар Де-Нолдун таасирин азайтат.

Де-Нол тетрациклиндин сиңишин азайтат.

Өзгөчө эскертүүлөр:

Дарылоону 8 жумадан ашырбоо керек.

Дозаны ашырбоо зарыл.

Висмут камтыган башка каражаттарды кошо колдонууга болбойт.

Дарылоо бүткөндө кандагы висмут деңгээли коопсуз (3–58 мкг/л), ал эми уулануу 100 мкг/лден жогору концентрацияда гана болот.

Узак мөөнөттүү жана жогорку дозада висмут колдонуу кээде кайтарым энцефалопатияга алып келиши мүмкүн, бирок сунушталган дозаларда бул коопсуз.

Кандай түстөгү заң жана тилдин карарышы болушу мүмкүн.

Дарылоо учурунда спирт ичимдиктерин ичүүгө болбойт.

Унаа айдоого жана кооптуу механизмдер менен иштөөгө таасири жок.

Дозадан ашып кетүү:

Белгилери:

Диспепсия, ооздун былжыр кабыгынын сезгениши, көк лента сымал тиш этинде кара тактар, бөйрөк функциясынын бузулушу.

Дарылоо:

Дарылоону токтотуу, ашказанды жууу, активдештирилген көмүр жана туздуу ич алдырма берүү.

Бөйрөк функциясын жана кандагы висмут деңгээлин көзөмөлдөө.

Керек болсо – комплекс түзүүчү заттарды колдонуу (димеркаптоянтардык же димеркаптопропансульфон кислоталары).

Оор бөйрөк жетишсиздигинде – гемодиализ сунушталат.

Чыгаруу формасы жана таңгактоо:

8 таблеткадан ПВХ/алюминий фольгадан жасалган блистерде.

7 же 14 блистер таңгакта, мамлекеттик жана орус тилдеринде колдонмо менен кошо салынат.

Сактоо шарттары:

25°C жогору эмес температурада, балдардан алыс жерде сактоо керек.

Сактоо мөөнөтү:

4 жыл. Таңгакта көрсөтүлгөн мөөнөт өткөндөн кийин колдонууга болбойт.