

Инструкция по применению

Действующие вещества: ксилометазолин

Форма выпуска: спрей

Состав

В 1 мл., жидкости: ксилометазолина гидрохлорид 1 млг.

Вспомогательные вещества: бензалкония хлорид - 0.1 мг, натрия хлорид - 5 мг, натрия эдетат - 0.5 мг, натрия дигидрофосфата дигидрат - 6 мг, натрия гидрофосфата додекагидрат - 3.5 мг, масло эвкалиптовое - 0.85 мг, вода д/и - до 1 мл.

Фармакологический эффект

Сосудосуживающий препарат для местного применения в ЛОР-практике.

Ксилометазолин (производное имидазолина) является альфа-адреномиметиком, вызывает сужение кровеносных сосудов слизистой оболочки носа, устраняя ее отек и гиперемию, восстанавливает проходимость носовых ходов, облегчает носовое дыхание и улучшает отхождение выделений из носа при ринитах (насморках) различного происхождения. Действие препарата наступает через несколько минут после его применения и продолжается до 10 ч.

Показания

- Острый ринит (в т.ч. на фоне острых респираторных заболеваний и аллергический ринит);
- Синусит
- Евстахиит;
- Средний отит (в составе комбинированной терапии для уменьшения отека слизистой оболочки носоглотки);
- Для облегчения проведения риноскопии;
- Подготовка больных к диагностическим манипуляциям в носовых ходах.

Противопоказания

- Артериальная гипертензия;
- Тахикардия;
- Выраженный атеросклероз;
- Глаукома;
- Атрофический ринит;
- Гипертиреоз;
- Хирургические вмешательства на мозговых оболочках (в анамнезе);
- Беременность (для капель назальных);
- Детский возраст до 2 лет;
- Детский возраст до 6 лет (для капель назальных 0.1% и спрея назального 0.1%);
- Повышенная чувствительность к компонентам препарата (в т.ч. к маслу эвкалиптовому). Не применять при терапии ингибиторами МАО и трициклическими антидепрессантами, а также с другими препаратами, повышающими АД.

Применение при беременности и кормлении грудью

В форме капель назальных противопоказан к применению при беременности. В форме спрея назального при беременности следует применять только после тщательной оценки соотношения пользы для матери и риска для плода, не допускается превышение рекомендуемых доз. В период грудного вскармливания препарат следует назначать с осторожностью.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 6 лет – по 1 впрыскиванию спрея назального 0.1% в каждый носовой ход 3 раза/сут. При необходимости можно повторить впрыскивание (не более двух впрыскиваний одновременно). Детям от 2 до 6 лет – по 1 впрыскиванию спрея назального 0.05% в каждый носовой ход 1-2 раза/сут. Не следует применять препарат более 3 раз/сут. Продолжительность лечения – не более 5-7 дней (без перерыва). После завершения терапии препарат можно назначать повторно только через несколько дней. Длительность применения препарата у детей определяет врач.

Побочные действия

Местные реакции: при частом и/или длительном применении - раздражение и/или сухость слизистой оболочки носоглотки, жжение, парестезии, чиханье, гиперсекреция. Редко - отек слизистой оболочки носа. Системные реакции: рвота, головная боль, сердцебиение, повышение АД, бессонница, нарушение зрения, депрессия (при длительном применении высоких доз).

Особые указания

Местные реакции: при частом и/или длительном применении: раздражение и/или сухость слизистой оболочки носоглотки, жжение, парестезии, чиханье, гиперсекреция. Редко: отек слизистой оболочки носа. Системные реакции: рвота, головная боль, сердцебиение, повышение АД, бессонница, нарушение зрения, депрессия (при длительном применении высоких доз).

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C

Условия отпуска из аптек

Без рецепта