

Көрсөтмөлөрү

Ооз көңдөйүнүн, тамактын, көмөкөйдүн инфекциялык-сезгенүү оорулары: тонзиллит; фарингит; ларингит (анын ичинде кесиптик мүнөздөгү - мугалимдерде, дикторлордо, химия жана көмүр өнөр жайынын кызматкерлеринде); каргылдануу; ооз көңдөйүнүн былжыр челинин жана тиш эттеринин сезгениши (афтоздук стоматит, гингивит, молочница).

Колдонуу ыкмасы

Чоңдорго жана 5 жаштан жогору балдарга сунушталат. Ар 2-3 саат сайын 1 таблеткадан соруп колдонулат. 24 сааттын ичинде 8 таблеткадан ашык кабыл албоо керек.

Каршы көрсөтмөлөрү

Препараттын курамындагы компоненттерге жогорку сезгичтик; 6 жашка чейинки балдар.

Ашыкча дозалоо

Белгилери: ашыкча дозалоо ыктымалдыгы төмөн. Мүмкүн болгон ашыкча дозалоо ашказан-ичеги жолунан дискомфортко (жүрөк айлануу) алып келиши мүмкүн. Дарылоо: симптоматикалык, дарыгердин көзөмөлүндө.

Өзгөчө көрсөтмөлөр

Эгер бир же бир нече кабыл алуу кокусунан өткөрүп жиберилсе, дозаны көбөйтпөйт.

Терс таасирлер

Аллергиялык реакциялар (бөртпө; тамакта күйүү же чымырап-тырсылдоо сезими; тамактын шишиши).

Кош бойлуулук/эмчек эмизүү учурунда колдонуу

Кош бойлуулук маалында жана эмчек эмизүү учурунда препаратты колдонуу дарыгердин көзөмөлү менен гана мүмкүн.

Дары-дармектик өз ара аракеттенүү

Башка препараттар менен клиникалык маанилүү өз ара аракеттенүүлөр аныкталган эмес. Препаратты башка жергиликтүү микробго каршы каражаттар менен бир убакта колдонууга болот.