

Витамин D – важнейший из витаминов, необходимый для минерального баланса в организме, играет важную роль на каждом этапе жизни, начиная с развития плода. Нормализует фосфорно-кальцевый обмен, укрепляет костную ткань, иммуномодулятор, уменьшает риск развития раковых, аутоиммунных заболеваний, уменьшает вероятность артериальной гипертензии.

Холекальциферол (Витамин D3) – биоактивное вещество, прогормон, самая легкоусвояемая форма из группы D1-D6. Стимулирует обменные процессы, ускоряет всасывание минералов. Проявляет свойства гормона – нормализует углеводный обмен. Повышает настроение, снимает тревогу, нервно-психическое расстройство, депрессию, устраняет бессонницу, налаживает работу сердца, сосудов, органов кроветворения.

Биодоступность D3 в препарате обеспечена токоферолом (Витамин E); холекальциферол – жирорастворимое вещество и хорошо усваивается в сочетании с липидами.

Увеличенная дозировка D3 показана к применению в очень редких случаях и может быть рекомендована только лечащим врачом. D3 накапливается в организме, поэтому длительное потребление высоких дозировок может вызвать патологическую деминерализацию костной ткани, отложение солей кальция.

иммуномодулятор, способствует снижению риска вирусных заболеваний
повышает энергетический потенциал организма
поддерживает здоровье сердечно-сосудистой, нервной системы
способствует укреплению зубов и костной ткани
благоприятно влияет на состояние кожи

СОСТАВ

Масло среднецепочечных триглицеридов, холекальциферол, концентрат смеси токоферолов (антиокислитель).

ПРИМЕНЕНИЕ

Взрослым по 4 капли (0,1 мл) во время еды, можно добавлять в еду и напитки. Детям с 3-х лет по 2 капли (0,05 мл). Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием БАД можно повторить. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Детям, беременным и кормящим женщинам принимать по рекомендации и под наблюдением врача педиатра.

Рекомендуемый прием обеспечивает суточную потребность витамина D3:

Норма приема	Содержание в суточной дозе витамина D3	% от нормы потребления
для детей от 3 до 17 лет (0,05 мл - 2 капли)	7,5 мкг (300 ME)	50
для взрослых (0,1 мл - 4 капли)	15 мкг (600 ME)	300*
для беременных и кормящих женщин (0,1 мл - 4 капли)	15 мкг (600 ME)	100

* не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Раздел 1, Приложение 5.

Не является лекарственным средством.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД.

Срок годности:
2 года