

Витамин D – важнейший из витаминов, необходимый для минерального баланса в организме, играет важную роль на каждом этапе жизни, начиная с развития плода. Нормализует фосфорно-кальциевый обмен, укрепляет костную ткань, иммуномодулятор, уменьшает риск развития раковых, аутоиммунных заболеваний, уменьшает вероятность артериальной гипертензии.

Холекальциферол (Витамин D3) – биоактивное вещество, прогормон, самая легкоусвояемая форма из группы D1-D6. Стимулирует обменные процессы, ускоряет всасывание минералов. Проявляет свойства гормона – нормализует углеводный обмен. Повышает настроение, снимает тревогу, нервно-психическое расстройство, депрессию, устраняет бессонницу, налаживает работу сердца, сосудов, органов кроветворения.

Биодоступность D3 в препарате обеспечена токоферолом (Витамин E); холекальциферол – жирорастворимое вещество и хорошо усваивается в сочетании с липидами.

Увеличенная дозировка D3 показана к применению в очень редких случаях и может быть рекомендована только лечащим врачом. D3 накапливается в организме, поэтому длительное потребление высоких дозировок может вызвать патологическую деминерализацию костной ткани, отложение солей кальция.

- иммуномодулятор, способствует снижению риска вирусных заболеваний
- повышает энергетический потенциал организма
- поддерживает здоровье сердечно-сосудистой, нервной системы
- способствует укреплению зубов и костной ткани
- благоприятно влияет на состояние кожи

Состав

Масло среднецепочечных триглицеридов, холекальциферол, концентрат смеси токоферолов (антиокислитель).

Применение

Взрослым, в том числе беременным и кормящим женщинам одно нажатие дозатора (0,1 мл) принимать во время еды, можно добавлять в еду и напитки. Продолжительность приема – 1 месяц. При необходимости прием БАД можно повторить.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Дозировка для детей с 3х лет только по согласованию с врачом-педиатром. Детям, беременным и кормящим женщинам принимать по рекомендации и под наблюдением врача педиатра.

Не является лекарственным средством.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов БАД.

Срок годности: 2 года