

Сүрөттөмөсү:

Биологиялык активдүү тамак-аш кошулмасы «CEVIMED, оозеки кабыл алуу үчүн С витамининин тамчылары», 1,5 жаштан баштап балдар үчүн эритме – С витамининин кошумча булагы болуп саналат.

Тамак-аш кошулмаларынын мүнөздөмөлөрү: Оозеки кабыл алуу үчүн тамчылар – тунук же ачык сары суюктук, даамы таттуу жана кычкыл.

Курамы: аскорбин кислотасы, суусуз глицерин, тазаланган суу.

1 тамчы 5 мг аскорбин кислотасын камтыйт. 1 мл = 20 тамчы

Негизги компоненти БАД «CEVIMED, витамин С тамчылары оозеки кабыл алуу үчүн» аскорбин кислотасы. Витамин С денебизде өтө маанилүү ролду ойногон кошулмаларды билдирет. Бул, биринчи кезекте, анын иммундук системага пайдалуу таасири менен шартталган болсо да, чындыгында, анын пайдасы, албетте, көбүрөөк.

Витамин С артыкчылыктары:

- организмдин иммунитетин колдойт.
- антиоксиданттык активдүүлүккө ээ;
- кан айлануу системасынын иштешин колдойт.
- колдоо көрсөтүүгө таасир этет.
- темирди сиңирүүнү жогорулатат.
- жараатты айыктыруу процесстерин колдойт.

Көрсөтмөлөр: Гипо- жана витамин С алдын алуу.

Аскорбин кислотасына болгон суроо-талаптын жогорулашынын абалы:

жасалма жана интенсивдүү тамактандыруу мезгили.

баланссыз тамактануу. Психикалык жана физикалык активдүүлүктүн жогорулашы; оор оорулардан кийин айыгуу мезгили.

күйүк оорусу, комплекстүү терапиянын бир бөлүгү катары: курч респиратордук инфекциялардын, курч респиратордук вирустук инфекциялардын фонунда ысытма абалы; узак мөөнөттүү өнөкөт инфекциялар.

Колдонуу боюнча сунуштар 1,5 – 3 жаштагы балдарга күнүнө бир жолу 9-10 тамчы (45 мг-50 мг) дайындалат.

3 жаштан 7 жашка чейинки балдарга күнүнө бир жолу 10-12 тамчы (50-60 мг) дайындалат.

7 жаштан 14 жашка чейинки балдарга дайындалат: балдар – 12-14 тамчы (60-70 мг) күнүнө бир жолу. Кыздар – 12 тамчы (60 мг) күнүнө бир жолу.

14 жаштан жогорку балдарга күнүнө бир жолу 14-15 тамчы (70-90 мг) дайындалат.

Чондорго (18 жаштан жогору) күнүнө бир жолу 20 тамчы (100 мг) дайындалат.

Колдонуудан мурун, дарыгерге кайрылуу керек.

Кош бойлуу жана эмчек эмизүү учурунда аялдар үчүн сунуштар Кош бойлуу аялдарга (I-III

триместр) күнүнө бир жолу 22 тамчы (110 мг) дайындалат.

Кабыл алуунун узактыгы: 20-30 күн

Зарыл болсо, курс дарыгер менен кеңешкенден кийин узартылышы же кайталанышы мүмкүн.

Каршы көрсөтмөлөр: БАД компоненттерине жеке чыдамсыздык.