Состав
Действующее вещество: вода Адриатического моря – 25 г.
Вспомогательные вещества: декспантенол 75 L (не менее 75% декспантенола)* — 1,33 г; вода очищенная – 73,67 г. *Декспантенол 75L – водный раствор, содержащий не менее 75% (R)-пантенола, стабилизированного приблизительно 1% D-пантолактона. Не содержит консервантов. Присутствие ионов: Na+ – мин. 1,90 мг/мл; Ca2+ – мин. 0,06 мг/мл; Mg2+ – мин. 0,25 мг/мл; Cl- – мин. 4,10 мг/мл; SO4 2– – мин. 0,45 мг/мл; HCO3 – – мин. 0,025 мг/мл.
Фармакологическое действие
Противоконгестивное средство. КОД АТХ: R01AX10
Фармакологические свойства
Аква Марис® Плюс представляет собой стерильный изотонический раствор, содержащий в своем составе морскую воду и декспантенол. Декспантенол — производное пантотеновой кислоты. Пантотеновая кислота — водорастворимый витамин комплекса В — является составной частью кофермента А. Декспантенол стимулирует регенерацию слизистой оболочки, нормализует клеточный метаболизм, оказывает регенерирующее и слабое противовоспалительное действие. При впрыскивании в полость носа Аква Марис® Плюс увлажняет слизистую оболочку, стимулирует регенерацию и оказывает трофическое действие на клетки слизистой оболочки полости носа. Препарат способствует разжижению слизи и нормализации ее выработки в бокаловидных клетках слизистой оболочки носовой полости. Микроэлементы, входящие в состав препарата, улучшают функцию мерцательного эпителия, что усиливает сопротивляемость слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух к внедрению болезнетворных бактерий и вирусов.
Показания
Аква Марис® Плюс показан: для лечения и профилактики атрофических и субатрофических ринитов; для очищения и увлажнения слизистой оболочки носа при воспалительных заболеваниях полости носа, носовых пазух и носоглотки, в том числе беременным женщинам и в период лактации; в комплексной терапии аллергических и вазомоторных ринитов (особенно лицам, предрасположенным или страдающим повышенной чувствительностью к лекарственным препаратам, в том числе беременным женщинам и в период лактации); для профилактики инфекций полости носа в осенне-зимний период (в том числе беременным женщинам и в период лактации); пациентам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, живущим и работающим в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, с целью сохранения физиологических характеристик слизистой оболочки полости носа в измененных микроклиматических условиях; людям, слизистая оболочка верхних дыхательных путей которых постоянно подвергается вредным воздействиям (курильщики, водители автотранспорта, люди, работающие в горячих и запыленных цехах, а также находящиеся в регионах

с суровыми климатическими условиями);людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой носа.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность и кормление грудью не являются противопоказаниями к применению.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие

Так как препарат не оказывает системного воздействия на организм, взаимодействия с другими лекарственными препаратами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами, используемыми для лечения насморка.

Как принимать, курс приема и дозировка

С лечебными целями: детям с 1 года до 7 лет: 4 раза в день по два вспрыскивания в каждый носовой ход; детям с 7 до 16 лет: 4–6 раз в день по два впрыскивания в каждый носовой ход; детям с 16 лет и взрослым: 4–8 раз в день по два - три вспрыскивания в каждый носовой ход. Курс лечения во всех случаях составляет 2–4 недели (на усмотрение лечащего врача). Рекомендуется повторить курс через месяц.

С профилактическими целями: детям с 1 года до 7 лет: 1–3 раза в день по одному – двум вспрыскиваниям в каждый носовой ход; детям с 7 до 16 лет: 2–4 раз в день по два впрыскивания в каждый носовой ход; детям с 16 лет и взрослым: 3–6 раз в день по два – три вспрыскивания в каждый носовой ход.

Передозировка

Случаи передозировки не отмечены.

Специальные указания

Не рекомендуется применять на улице в холодное время года, не рекомендуется выходить из теплого помещения на улицу сразу после применения препарата в холодное время года.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управления транспортными средствами и механизмами.

Форма выпуска

Бесцветный прозрачный раствор без запаха.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Срок годности

2 года.